

ТОС-МАЙ: комбінований засіб проти сухого кашлю

Скарги клієнта аптеки

Сухий виснажливий та/або «гавкотливий» кашель

Сухий кашель, що призводить до порушення сну та апетиту

Необхідно з'ясувати

- Вік хворого
- Які засоби вже вживали
- Якщо хворіє доросла людина, уточнити, чи палить вона або контактує з іншими шкідливими чинниками (пил, дим, хімічні речовини тощо)

Уточнити наявність «симптомів тривоги»

- Висока температура тіла (понад 38–39 °С) протягом двох і більше днів
- Субфебрильна температура протягом тижня та більше
- Кашель виник раптово (підозра на інохідне тіло дихальних шляхів)
- Напади сухого кашлю тривають безперервно протягом години і більше
- Кашель супроводжується утрудненим диханням, болем у грудній клітці, втратою голосу
- Домішки крові у виділеннях з дихальних шляхів
- Алергійна висипка на шкірі та/або набряки
- Збільшення лімфатичних вузлів на шиї
- Рясне потовиділення та значна слабкість
- Суттєве зменшення ваги тіла

Так

Необхідна консультація лікаря

Ні

При неускладнених гострих респіраторних інфекціях, запальних процесах верхніх та нижніх дихальних шляхів (фарингіт, тонзиліт, ларингіт, трахеїт, бронхіт) можна застосовувати

Безрецептурні препарати

- Протикашльові засоби центральної дії
- Протикашльові засоби периферійної дії
- Протикашльові засоби центральної дії + периферійної дії (декстрометорфану гідробромід)

Загальні рекомендації

- Утримуватися від паління та вдихання тютюнового диму
- Забезпечити надходження свіжого повітря до приміщення
- Вживати збільшену кількість рідини


з 6 років



ТОС-МАЙ проти сухого кашлю у дорослих та дітей

(декстрометорфану гідроброміду 2 мг, бензокаїну 0,2 мг, гуайяколсульфонату калію 35 мг, бензоату натрію 15 мг)

Протикашльовий ефект



- Зменшує першіння в горлі та знижує больові відчуття
- Сприяє переходу непродуктивного кашлю у продуктивний

З метою досягнення швидкої дії препарату таблетки слід повільно розсмоктувати в порожнині рота.

ЛАНГЕС: при вологому кашлі

Скарги клієнта аптеки

Вологий кашель

Кашель з утрудненим відходженням мокротиння

Необхідно з'ясувати

• У кого виникла проблема (дорослий, дитина)

• Як давно тривають симптоми

Уточнити наявність «симптомів тривоги»

- Висока температура тіла (понад 38–39 °С) протягом двох і більше діб
- Субфебрильна температура протягом тижня та більше
- Інтенсивність кашлю зростає
- Кашель супроводжується утрудненим диханням, болем у грудній клітці, втратою голосу
- Є густе зеленувате мокротиння та/або домішки крові
- З'явилися рясне потовиділення та значна слабкість
- Суттєво зменшилася вага тіла

Так

Необхідна консультація лікаря

Ні

При неускладнених гострих респіраторних інфекціях, гострому бронхіті, загостренні хронічних захворювань дихальної системи

Безрецептурні препарати

- Муколітики (карбоцистеїн та ін.)
- Відхаркувальні засоби

Загальні рекомендації

- Утримуватися від паління та вдихання тютюнового диму
- Забезпечити надходження свіжого повітря до приміщення
- Вживати збільшену кількість рідини

ЛАНГЕС — муколітик з мукорегулюючою дією

(1 мл орального розчину містить 50 мг карбоцистеїну)



Починає діяти через 2 години

- 👉 Розріджує мокротиння і нормалізує реологічні властивості бронхіального секрету
- 👉 Покращує мукоциліарний кліренс
- 👉 Сприяє регенерації слизової оболонки дихальних шляхів
- 👉 Відновлює секрецію імунологічно активного IgA
- 👉 Підвищує ефективність антибактеріальної терапії
- 👉 Зменшує набряк бронхів і бронхообструкцію



з 2 років